

Lugano.

Srednje kasna sorta žute boje mesa namijenjena preradi, dobre otpornosti na krumpirove cistolike nematode.



Prerada
Prženi
krumpirići



Tradicionalni

- » **Krupni gomolji**
- » **Jako dobra otpornost**
- » **Dobro skladištenje**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: F.J. Vos

Križanje: AR 00-2211 x AR 99-0669

Autorsko pravo: 31-12-2048

Sjeme: VO 07-0289

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 5,5

Svijetla boja klice: crvena / R

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: ispod prosjeka / 7

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5

Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7

Boja pokožice: žuta / Y

Boja mesa: svjetložuta / 6,5

Glatkoća pokožice: prosječan / 6

Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6

Tuberizacija: umjereno mali / 5

Krupnoća gomolja: krupan / 8

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Dormantnost: duga / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6

Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Oštećenje prilikom berbe: vrlo osjetljiv / 4,5

Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5

Bentazon: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6

Podvodna težina: 394

Postotak suhe tvari: 21,4%

Kulinarški tip: umjereno brašnast / B

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5

Oksidacija sirovog krumpira: umjereno osjetljiv / 6

Kvaliteta prženih krumpirića: dobar / 7

Raspodjela suhe tvari: dobra / 7,5

Čips kvaliteta: ispodprosječan / 5,5

TGA razina: 6,4

Karvonsko ulje: 25% više gomolja / 8

Preporuke za uzgoj



www.interagrico.hr

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 20%.

Tretiranje sjemena

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego dvaput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 36 cm (37.000 biljaka/ha)

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporučuje se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugotrajno skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: osjetljiv / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7,5

Prskanje: osjetljiv / 5,5

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 7,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: malo osjetljiv / 9

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otporan / 9

R_Golden nematode Ro 5: otporan / 9

Nematoda Pa 2: otporan / 9

Nematoda Pa 3: otporan / 9