

Riviera.



Tradicionalni

Vrlo rana sorta atraktivne pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, dobre otpornosti na viruse i dobrog prinosa.

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Lijep izgled**
- ▶ **Dobra otpornost na viruse**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Mts. Boerhave
Križanje: MINERVA x ALCMARIA
Autorsko pravo: 31-12-2030
Sjeme: BH 86-0266

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: vrlo rana berba / 8
Svijetla boja klice: plavo ljubičasta / BV
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: prosječno / 7
Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6,5
Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svjetložuta / 6
Glatkoća pokožice: izvrstan / 8
Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6
Tuberizacija: umjereno mali / 5
Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5
Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6
Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
Bentazon: - / -
Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
Podvodna težina: 318
Postotak suhe tvari: 17,7%
Kulinarški tip: umjereno čvrst / AB
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5
Oksidacija sirovog krumpira: - / -
Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 4,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Čips kvaliteta: nije pogodan / 4
TGA razina: 4,8
Karvonsko ulje: 5% manje gomolja / 4

Kako uzgojiti



www.interagrico.hr

Gnojdba¹

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

¹ Gnojdba se temelji na analizi tla

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 3

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Virus - A: - / -

Say potato,
say Agrico.

Virus - X: - / -

Nagnječenje: osjetljiv / 5,5

Erwinia (crna noga): osjetljiv / 5

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -