

Paradiso.



Tradicionalni

Rana sorta glavnog usjeva koja daje velike gomolje i izvrstan prinos za tradicionalno tržište.

Image:

- ▶ **Veliki gomolji**
- ▶ **Lijep izgled**
- ▶ **Dobra tolerancija na modrice i oštećenja**

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: M. Pot & M. Klaver
 Križanje: RODEO x VALOR
 Autorsko pravo: 31-12-2048
 Sjeme: PK 06-0108

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6
 Svijetla boja klice: crvena / R
 Boja cvijeta: ljubičasta / P
 Broj bobica: ispod prosjeka / 6,5
 Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7,5
 Krajnji razvoj lisne mase: sasvim dobro / 7,5
 Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7
 Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
 Boja pokožice: žuta / Y
 Boja mesa: svjetložuta / 6
 Glatkoća pokožice: dobar / 7
 Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL
 Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5
 Tuberizacija: prosječan / 6
 Krupnoća gomolja: krupan / 8
 Ujednačenost veličine gomolja: umjereno pravilan / 6,5
 Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
 Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7,5
 Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5
 Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6,5
 Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
 Metribuzin: umjereno osjetljiv / 6,5
 Bentazon: umjereno osjetljiv / 6,5
 Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
 Podvodna težina: 329
 Postotak suhe tvari: 18,2%
 Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
 Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5
 Oksidacija sirovog krumpira: - / -
 Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 4,5
 Raspodjela suhe tvari: - / -
 Čips kvaliteta: nije pogodan / 4
 TGA razina: 4,8
 Karvonsko ulje: 5% manje gomolja / 4
 Stopa mutacije: Ova sorta može pokazati visoku stopu mutacije. Stoga se uporaba karvonskog ulja ne preporučuje. / Use of carvone oil can provoke mutations.



How to grow

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 20%. Preporučuje se split aplikacija, druga aplikacija ubrzo nakon zamatanja gomolja.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

Tretiranje sjemena

Uklanjanje klice može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporučuje se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričeka najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 6

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7,5

Prskanje: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Prašasta krastavost: umjereno osjetljiv / 7,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Nagnječenje: osjetljiv / 5,5

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -