

# Vogue.



Tradicionalni

Srednje rana sorta s ujednačenim i krupnim gomoljima.

Image:

- ▶ **Pretežno čvrsta prilikom kuhanja**
- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Rano zametanje gomolja**

## characteristics

### Opće karakteristike

Uzgajivač: Konst Research B.V.  
 Križanje: MARABEL x AMOROSA  
 Autorsko pravo: 31-12-2046  
 Sjeme: KO 03-2027

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5  
 Svijetla boja klice: zeleno crvena / GR  
 Boja cvijeta: bijela / W  
 Broj bobica: vrlo visok / 4  
 Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7  
 Krajnji razvoj lisne mase: sasvim dobro / 7,5  
 Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7  
 Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6  
 Boja pokožice: žuta / Y  
 Boja mesa: žuta / 7  
 Glatkoća pokožice: prosječan / 6  
 Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL  
 Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7  
 Tuberizacija: umjereno mali / 5,5  
 Krupnoća gomolja: krupan / 8  
 Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7  
 Dormantnost: umjereno kratka / 5

### Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5  
 Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8  
 Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5  
 Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6  
 Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8  
 Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5  
 Bentazon: malo osjetljiv / 7  
 Etilen: 5% manje do 5% više gomolja / 5  
 Podvodna težina: 311  
 Postotak suhe tvari: 17,3%  
 Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB  
 Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7,5  
 Oksidacija sirovog krumpira: - / -  
 Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 5  
 Raspodjela suhe tvari: - / -  
 Čips kvaliteta: nije pogodan / 4  
 TGA razina: 3,7  
 Karvonsko ulje: 25% više gomolja / 8

# How to grow



## Gnojidba<sup>1</sup>

**Dušik:** standardne preporuke - 10%. Preporučuje se split aplikacija, druga aplikacija ubrzo nakon zemetanja gomolja.

**Fosfat:** standardne preporuke.

**Kalij:** standardne preporuke + 10%.

## Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zemetanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

## Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Otpornosti

**Virus - uvijenost lišća:** - / -

**Virus - Yn:** umjereno osjetljiv / 6,5

**Virus - Yntn (gomolj):** osjetljiv / 5

**Prskanje:** vrlo osjetljiv / 4

**Fitoftora (plamenjača) lista:** vrlo osjetljiv / 4

**Fitoftora (plamenjača) gomolja:** umjereno osjetljiv / 6

**Fusarium (suha trulež):** umjereno osjetljiv / 6,5

**Obična krastavost:** umjereno osjetljiv / 6

**Praškasta krastavost:** vrlo osjetljiv / 2

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** umjereno do neosjetljiv / 8

**Nagnječenje:** vrlo osjetljiv / 4,5

**Erwinia (crna noga):** - / -

**Bradavičasta bolest krumpira F1:** malo osjetljiv / 9

**Bradavičasta bolest krumpira F6:** - / -

**Bradavičasta bolest krumpira F18:** - / -

**Zlatna nematoda Ro 1/4:** otporan / 9

**Zlatna nematoda Ro 2/3:** - / -

**Nematoda Pa 2:** - / -

**Nematoda Pa 3:** - / -