

# Riviera.



Tradicionalni

Vrlo rana sorta atraktivne pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, dobre otpornosti na viruse i dobrog prinosa.

Image:

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Lijep izgled**
- ▶ **Dobra otpornost na viruse**

## characteristics

### Opće karakteristike

Uzgajivač: Mts. Boerhave  
 Križanje: MINERVA x ALCMARIA  
 Autorsko pravo: 31-12-2030  
 Sjeme: BH 86-0266

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: vrlo rana berba / 8  
 Svijetla boja klice: plavo ljubičasta / BV  
 Boja cvijeta: bijela / W  
 Broj bobica: vrlo visok / 4  
 Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7  
 Krajnji razvoj lisne mase: prosječno / 7  
 Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6,5  
 Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5  
 Boja pokožice: žuta / Y  
 Boja mesa: svjetložuta / 6  
 Glatkoća pokožice: izvrstan / 8  
 Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR  
 Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6  
 Tuberizacija: umjereno mali / 5  
 Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5  
 Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7  
 Dormantnost: prosječna / 6

### Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5  
 Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8  
 Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5  
 Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6  
 Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8  
 Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8  
 Bentazon: - / -  
 Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6  
 Podvodna težina: 318  
 Postotak suhe tvari: 17,7%  
 Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB  
 Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5  
 Oksidacija sirovog krumpira: - / -  
 Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 4,5  
 Raspodjela suhe tvari: - / -  
 Čips kvaliteta: nije pogodan / 4  
 TGA razina: 4,8  
 Karvonsko ulje: 5% manje gomolja / 4

# How to grow



## Gnojidba<sup>1</sup>

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

## Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zamatanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

## Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 3

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Nagnječenje: osjetljiv / 5,5

Erwinia (crna noga): osjetljiv / 5

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -