

Sinora.

Srednje rana sorta visokog prinosa koja se lako uzgaja, za prženje ili čips.



Prerada
Prženi
krumpirići
Čips

- ▶ **Rana sorta prikladna za isporuku izravno s polja**
- ▶ **Visok postotak suhe tvari**
- ▶ **Dobra otpornost na viruse**

Image:

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: J. Schilt
Križanje: AGRIA x AM 70-2166
Autorsko pravo: 31-12-2027
Sjeme: SI 85-0482

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 7
Svijetla boja klice: plavo ljubičasta / BV
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lisna masa - početni razvoj: brzo / 8
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svjetložuta / 6,5
Glatkoća pokožice: prosječan / 6
Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6
Tuberizacija: umjereno velik / 7
Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6,5
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5
Oštećenje prilikom berbe: vrlo osjetljiv / 4,5
Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
Bentazon: umjereno osjetljiv / 6,5
Etilen: - / -
Podvodna težina: 416
Postotak suhe tvari: 22,6%
Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5
Oksidacija sirovog krumpira: osjetljiv / 5
Kvaliteta prženih krumpirića: vrlo dobar / 7,5
Raspodjela suhe tvari: dobra / 7
Čips kvaliteta: dobar / 7
TGA razina: 8,2
Karvonsko ulje: 15% do 25% više gomolja / 7

How to grow



Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke + 25%. Ne preporučuje se primjena stajskog gnojiva.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego dvaput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: umjereno osjetljiv / 6

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: osjetljiv / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8,5

Nagnječenje: - / -

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: osjetljiv / 4

Nematoda Pa 3: osjetljiv / 2