

Rosalyn.

Korai, bőtermő, hamvas piros héjú fajta

- ▶ Kivételesen gyors gumókötés
- ▶ Sápadt burgonya-fonálféreg és burgonyarák ellen rezisztens
- ▶ Sugárgombás varasodásnak jól ellenáll



**Piaci
szegmens**
- Friss
piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 05-1073 x EVOLUTION

Magonc: HL 12-0801

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: korai / 7

Fénycsíra színe: - / -

Virág színe: lila / P

Bogyók száma (termés): átlag alatti / 6,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: kimondottan gyors / 8

Lombozat - kifejllett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj színe: piros / R

Hús színe: világos sárga / 6

Héj minőség: átlag feletti / 6,5

Gumóforma: ovális-hosszú / OL

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: átlag feletti / 7

Gumóméret: átlag feletti / 7,5

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernöves: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenysége: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés előtt: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7

Bentazon: - / -

Etilén: - / -

Vízalatti súly: 327

Száranyag tartalma: 18,1%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): - / -

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: nem megfelelő / 5

Száranyag eloszlás: - / -

Chips minőség: - / -

TGA-szint: 8,6

Karvon olaj: - / -

S_{Dormancy}: átlagos / 6


www.agricopotatoes.com

Termesztési tanácsok

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: -

Foszfát: -

Kálium: -

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. A csíráatlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

Gyomok ellen

Kelés után metribuzin (Sencor) használata tilos, károsítja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Rövid - közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: fogékony / 5

Yn vírus (gumó): - / -

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 3

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6

Fuzárium: fogékony / 5,5

Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6,5

Poros varasodás: - / -

A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: - / -

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: nem fogékony / 10

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: fogékony / 4

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: ellenálló / 9

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: talajban ellenálló / 8