

Agria.

Maincrop, yellow fleshed, processing variety with a good yield and a very stable quality.

- ▶ **Excellent frying quality**
- ▶ **Multiple virus resistances**
- ▶ **Good storability**



Piaci szegmens - Bio
Bio



Piaci szegmens - Feldolgozóipar
Hasábburgonya
Burgonyaszírom
Félkész



Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac



Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: QUARTA x SEMLO

Védettség: Szabad fajta

Magonc: BM 77-0945

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: kései / 5

Fénycsíra színe: kékes lila / BV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): nincs / 8

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: sárga / 7

Héj minőség: átlagos / 6

Gumóforma: ovális-hosszú / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlag alatti / 5

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: kimondottan hosszú / 8

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6

Szürkülés (mechanikai behatástól): eléggé érzékeny / 6

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5

Betakarításkori sérülékenysége: érzékeny / 5

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7,5

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5

Bentazon: eléggé érzékeny / 6,5

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 402

Száranyag tartalom: 21,8%

Főzési típus: szétfővő / BC

Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7

Elszíneződési hajlam: kissé érzékeny / 7

Sütési minőség: kiváló / 8

Száranyag eloszlás: átlagos / 6,5

Chips minőség: jó / 7

TGA-szint: 2,7

Karvon olaj: 25%-kal több gumó / 8

S_Dormancy: kimondottan hosszú / 8

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

Rövid hősokk vagy előcsíráztatás ajánlott. A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem befolyásolja a termést, de elszínezheti a lombozatot.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés javasolt.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Feldolgozásra alkalmas fajta, 7 °C felett tárolandó. Hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: kissé fogékony / 6

Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 7

Lombfitoftóra: fogékony / 5,5

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 7

Fuzárium: kissé fogékony / 6,5

Sugárgombás varasodás: kimondottan fogékony / 4,5

Poros varasodás: kimondottan fogékony / 3

A-vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 9

Say potato,
say Agrico.

X vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Kolletotrichumos megbetegedés: - / -

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: kissé fogékony / 9

Burgonyarák F6: fogékony / 6

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: fogékony / 2

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: fogékony / 2