

Alouette.

An early maincrop, versatile, red skin ware variety, with natural protection against late blight in foliage and tuber, and suitable for conventional and organic production.

- ▶ **Uniform tuber shape and size**
- ▶ **Suitable for cooking and home baked products**
- ▶ **Good drought tolerance**



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 02-139-1 x LAURA

Magonc: AR 04-3153

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: középkorai / 6

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4

Lombozat - kezdeti fejlődés: kimondottan gyors / 8

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj színe: piros / R

Hús színe: sárga / 7,5

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszúak / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: átlag feletti / 7

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövény: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5

Betakarításkori sérülékenysége: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7,5

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5%-kal kevesebb gumó / 4

Vízalatti súly: 389

Száranyag tartalom: 21,1%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7

Elszíneződési hajlam: kissé érzékeny / 7

Sütési minőség: átlag feletti / 6,5

Száranyag eloszlás: - / -

Chips minőség: - / -

TGA-szint: 3,6

Karvon olaj: 5-15%-kal több gumó / 6

S_Dormancy: átlagos / 6

Mutációs hajlam: Ez a fajta mutációra hajlamos, carvone tartalmú szerek használata kerülendő. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség + 20%.

Gumókezelés

A fajta lassú kezdeti növekedése miatt csak kellően meleg talajba javasolt ültetni. A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre. Egnél többszöri csíráatlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)
 35/55 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra rezisztencia ellenére a fertőzés tüneteinek rendszeres ellenőrzése javasolt.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Feldolgozásra alkalmas fajta, 7 °C felett tárolandó. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5,5
Lombfitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 9
Gumó fitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 9
Fuzárium: kissé fogékony / 7,5
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5
A-vírus: - / -

**Say potato,
say Agrico.**

X vírus: kissé fogékony / 7
Kolletotrichumos megbetegedés: - / -
Ervinia: - / -
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: talajban ellenálló / 8
R_Golden nematode Ro 5: mérsékelten fogékony* / 6*
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -