CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Arizona.

Korai fajta, éghajlati viszonyoktól függetlenül bőtermő.

- **Egységes gumó forma és méret**
- **Jó szárazságtűrő képesség**
- **Többféle vírus rezinsztencia**

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Magonc: AR 98-0313

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: korai / 7
Fénycsíra színe: vöröses lila / RV
Virág színe: fehér / W
Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5
Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7
Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8
Lombozat - szilárdság: átlagos / 6
Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5
Héj szín: sárga / Y
Hús szín: világos sárga / 6
Héj minőség: átlag feletti / 6,5
Gumóforma: ovális / O
Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7,5
Gumókötésszám: átlagos / 6
Gumóméret: nagy méretű / 8
Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7
Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: kissé érzékeny / 7
Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7
Gumórepedés: kissé érzékeny / 7
Betakarításkori sérülékenység: kissé érzékeny / 7
Metribuzin - kelés előtt: érzékeny / 5
Metribuzin - kelés után: eléggé érzékeny / 6,5
Bentazon: kissé érzékeny / 7
Etilén: 15-25%-kal több gumó / 7
Vízalatti súly: 301
Szárazanyag taratlom: 17%
Főzési típus: nem szétfővő / AB
Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5
Elszíneződési hajlam: - / -
Sütési minőség: nem megfelelő / 4
Szárazanyag eloszlás: - / -
Chips minőség: nem megfelelő / 4
TGA-szint: 4,2
Karvon olaj: 5-15%-kal több gumó / 6
S_Dormancy: átlagos / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Egynél többszöri csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

28/35 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után metribuzin (Sencor) használata tilos, károsítja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 ºC. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8
Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4
Gumó fitoftóra: fogékony / 5
Fuzárium: kissé fogékony / 6
Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5
Poros varasodás: kimondottan fogékony / 2
A-vírus: - / -
X vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Kolletotrichumos megbetegedés: kimondottan fogékony / 4
Ervinia: kissé fogékony / 6
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: fogékony / 6
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com