

# Arizona.

Korai fajta, éghajlati viszonyoktól függetlenül bőtermő.

- ▶ **Egységes gumó forma és méret**
- ▶ **Jó szárazságtűrő képesség**
- ▶ **Többféle vírus rezisztencia**



**Piaci szegmens**  
- Friss piac  
Friss piac



## characteristics

### Általános jellemzők

Keresztezés: UK 150-19D22 x MASCOTTE

Magonc: AR 98-0313

### Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: korai / 7

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: átlagos / 6

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: világos sárga / 6

Héj minőség: átlag feletti / 6,5

Gumóforma: ovális / O

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7,5

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

### Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: kissé érzékeny / 7

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenysége: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés előtt: érzékeny / 5

Metribuzin - kelés után: eléggé érzékeny / 6,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 15-25%-kal több gumó / 7

Vízalatti súly: 301

Szárazanyag tartalom: 17%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzőkor): eléggé érzékeny / 6,5

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: nem megfelelő / 4

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 4,2

Karvon olaj: 5-15%-kal több gumó / 6

S\_Dormancy: átlagos / 6

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Tápanyag ellátás és gumókezelés<sup>1</sup>

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

## Gumókezelés

Egynél többszöri csíráatlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

## Gyomok ellen

Kelés után metribuzin (Sencor) használata tilos, károsítja a lombozatot és a termést.

## Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

## Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Közepesen hosszú ideig tárolható.



## Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8

Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4

Gumó fitoftóra: fogékony / 5

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5

Poros varasodás: kimondottan fogékony / 2

A-vírus: - / -

Say potato,  
say Agrico.

X vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Kolletotrichumos megbetegedés: kimondottan fogékony / 4

Ervinia: kissé fogékony / 6

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: fogékony / 6

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -