

Babylon.

Sárga húsú, kései, bőtermő, stabil minőségű feldolgozó ipari fajta.

- ▶ **Kiváló sütési minőség**
- ▶ **Többféle vírus rezisztencia**
- ▶ **Jó tárolhatóság**



Piaci szegmens - Feldolgozóipar
Hasábburgonya
Burgonyaszírom
Félkész



Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac



Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: AGRIA MUTANT

Magonc: BA 06-0001

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: kései / 5

Fénycsíra színe: kékes lila / BV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): nincs / 8

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: szilárd / 8

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: sárga / 7

Héj minőség: átlagos / 6

Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: kimondottan hosszú / 8

Ellenállóképesség és minőség

Ikernöves: eléggé érzékeny / 6

Szürkülés (mechanikai behatástól): eléggé érzékeny / 6

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6

Betakarításkori sérülékenysége: érzékeny / 5,5

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7,5

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7,5

Etilén: 5%-kal kevesebb vagy több gumó / 5

Vízalatti súly: 401

Száranyag tartalom: 21,7%

Főzési típus: szétfővő / BC

Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7

Elszíneződési hajlam: kissé érzékeny / 7

Sütési minőség: kiváló / 8

Száranyag eloszlás: jó / 7

Chips minőség: jó / 7

TGA-szint: 5,2

Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7

S_Dormancy: kimondottan hosszú / 8

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre. Egyszeri csíráztatás lehetséges.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

35/55 mm: 30 cm (44.000 tő/ha)

50/55 mm: 38 cm (35.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés javasolt.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Feldolgozásra alkalmas fajta, 7 °C felett tárolandó. Hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: kissé fogékony / 7,5

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6,5

Lombfitoftóra: fogékony / 5,5

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6,5

Fuzárium: kissé fogékony / 7

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5

Poros varasodás: - / -

A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: kimondottan fogékony / 4,5

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: talajban ellenálló / 8

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -