CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Babylon.

Sárga húsú, kései, bőtermő, stabil minőségű feldolgozó ipari fajta.

- **Kiváló sütési minőség**
- **Többféle vírus rezinsztencia**
- **Jó tárolhatóság**

Piaci szegmens - Feldolgozóipar
Hasábburgonya
Burgonyaszirom
Félkész

Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: AGRIA MUTANT
Magonc: BA 06-0001

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: kései / 5
Fénycsíra színe: kékes lila / BV
Virág színe: fehér / W
Bogyók száma (termés): nincs / 8
Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7
Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8
Lombozat - szilárdság: szilárd / 8
Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5
Héj szín: sárga / Y
Hús szín: sárga / 7
Héj minőség: átlagos / 6
Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL
Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7
Gumókötésszám: átlagos / 6
Gumóméret: nagy méretű / 8
Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7
Nyugalmi idő: kimondottan hosszú / 8

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6
Szürkülés (mechanikai behatástól): eléggé érzékeny / 6
Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6
Betakarításkori sérülékenység: érzékeny / 5,5
Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7,5
Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5
Bentazon: kissé érzékeny / 7,5
Etilén: 5%-kal kevesebb vagy több gumó / 5
Vízalatti súly: 401
Szárazanyag taratlom: 21,7%
Főzési típus: szétfővő / BC
Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7
Elszíneződési hajlam: kissé érzékeny / 7
Sütési minőség: kiváló / 8
Szárazanyag eloszlás: jó / 7
Chips minőség: jó / 7
TGA-szint: 5,2
Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7
S_Dormancy: kimondottan hosszú / 8

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre.Egyszeri csírátlanítás lehetséges.

Tőtávolság

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.000 tő/ha)
50/55 mm: 38 cm (35.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés javasolt.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 ºC. Feldolgozásra alkalmas fajta, 7 ºC felett tárolandó. Hosszú ideig tárolható.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: kissé fogékony / 7,5
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6,5
Lombfitoftóra: fogékony / 5,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6,5
Fuzárium: kissé fogékony / 7
Sugárgombás varasodás: fogékony / 5
Poros varasodás: - / -
A-vírus: - / -
X vírus: - / -
Kolletotrichumos megbetegedés: kimondottan fogékony / 4,5
Ervinia: - / -
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: talajban ellenálló / 8
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com