

Esmee.

Korai, piros héjú, bőtermő étkezési fajta jó szárazságtűrő képességgel.


- ▶ Gyönyörű kinézet
- ▶ Nagyméretű gumók
- ▶ Többféle vírus rezisztencia



**Piaci szegmens -
Kiskereskedelem**
Friss piac



**Piaci szegmens -
Friss piac**
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: LAURA x RODEO

Magonc: AR 01-0410

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: korai / 6,5

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: dús / 7,5

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj színe: piros / R

Hús színe: sárga / 7

Héj minőség: kiváló / 8

Gumóforma: ovális-hosszúka / OL

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernöves: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6

Betakarításkori sérülékenységi: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés előtt: kimondottan érzékeny / 4

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5%-kal kevesebb vagy több gumó / 5

Vízalatti súly: 326

Szárazanyag tartalom: 18%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkületési hajlam (főzéskor): érzékeny / 5,5

Elszíneződési hajlam: eléggé érzékeny / 6

Sütési minőség: átlagos / 6

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 8,2

Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7

S_Dormancy: átlagos / 6

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. A csíráltatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után metribuzin (Sencor) használata tilos, károsítja a lombzatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 7
Fuzárium: kissé fogékony / 7
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5
A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Kolletotrichumos megbetegedés: fogékony / 5,5
Ervinia: kissé fogékony / 7
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: - / -
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -