


Evolution.

Korai, mélypiros héjú, bőtermő étkezési fajta.



**Piaci
szegmens**
- Friss
piac
Friss piac

- ▶ **Nagyméretű gumók**
- ▶ **Jó szárazságtűrő képesség**
- ▶ **Többféle fonálféreg rezisztencia**



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 94-0807 x AMOROSA

Magonc: AR 99-0522

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: korai / 6,5

Fénycsíra színe: zöldes vörös / GR

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: átlagos / 6,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj szín: piros / R

Hús szín: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszú / OL

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6

Gumókötésszám: átlag feletti / 7

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Nyugalmi idő: kimondottan rövid / 4

Ellenállóképesség és minőség

Ikernöves: eléggé érzékeny / 6

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6

Betakarításkori sérülékenységi: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 343

Szárazanyag tartalom: 18,9%

Főzési típus: kissé szétfővő / B

Szürkületi hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: nem megfelelő / 4,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 8

Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4

S_Dormancy: kimondottan rövid / 4



How to grow

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. Egynél többszöri csíratlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem befolyásolja a termést, de elszínezheti a lombzatot.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Tárolás nélküli értékesítésre - rövid távú tárolásra alkalmas.



Say potato,
say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: fogékony / 5,5

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7

Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6

Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5

A-vírus: - / -

X vírus: kissé fogékony / 7,5

Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 6

Ervinia: kissé fogékony / 6

Burgonyarák F1: mérsékelten fogékony / 8

Burgonyarák F6: nem fogékony / 10

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: mérsékelten fogékony / 6

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: talajban ellenálló / 7

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: mérsékelten fogékony / 5