CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Levante.

Középkorai, bőtermő, gumó- és lombfitoftóra rezisztens étkezési fajta.

- **Magas gumókötésszám**
- **Jó héjminőség**
- **Jól tárolható**

Piaci szegmens - Bio
Bio

Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 01-3218 x ALMERA

Magonc: AR 07-3009

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: középkorai / 5,5

Fénycsíra színe: zöldes vörös / GR

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj szín: sárga / Y

Hús szín: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: hosszúkás-ovális / LO

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: magas / 8

Gumóméret: átlag feletti / 7

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6,5

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: kissé érzékeny / 7

Szürkülés (mechanikai behatástól): eléggé érzékeny / 6,5

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenység: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés után: érzékeny / 5,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5%-kal kevesebb gumó / 4

Vízalatti súly: 365

Szárazanyag taratlom: 19,9%

Főzési típus: kissé szétfőző / B

Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7

Elszíneződési hajlam: érzékeny / 5,5

Sütési minőség: átlag alatti / 5,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4,5

TGA-szint: 4,73

Karvon olaj: 5-15%-kal több gumó / 6

S_Dormancy: átlagos / 6,5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség.Több ütemben kijutattva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

A fajta lassú kezdeti növekedése miatt csak kellően meleg talajba javasolt ültetni.A csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.Rövid hősokk vagy előcsíráztatás ajánlott.

Tőtávolság

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)
35/55 mm: 27 cm (49.500 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra rezisztencia ellenére a fertőzés tüeneteinek rendszeres ellenőrése javasolt.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 ºC. Közepesen hosszú - hosszú ideig tárolható.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: kissé fogékony / 6
Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8,5
Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4,5
Lombfitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 8,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 7,5
Fuzárium: kissé fogékony / 6
Sugárgombás varasodás: fogékony / 5
Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5
A-vírus: - / -
X vírus: - / -
Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7,5
Ervinia: - / -
Burgonyarák F1: - / -
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com