

# Levante.

Középkorai, bőtermő, gumó- és lombfitoftóra rezisztens étkezési fajta.

- ▶ **Magas gumókötésszám**
- ▶ **Jó héjminőség**
- ▶ **Jól tárolható**



**Piaci szegmens - Bio**  
Bio



**Piaci szegmens - Kiskereskedelem**  
Friss piac



**Piaci szegmens - Friss piac**  
Friss piac



## characteristics

### Általános jellemzők

Keresztezés: AR 01-3218 x ALMERA

Magonc: AR 07-3009

### Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: középkorai / 5,5

Fénycsíra színe: zöldes vörös / GR

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: hosszúkás-ovális / LO

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: magas / 8

Gumóméret: átlag feletti / 7

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6,5

### Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: kissé érzékeny / 7

Szürkülés (mechanikai behatástól): eléggé érzékeny / 6,5

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenysége: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés után: érzékeny / 5,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5%-kal kevesebb gumó / 4

Vízalatti súly: 365

Száranyag tartalom: 19,9%

Főzési típus: kissé szétfővő / B

Szürkülési hajlam (főzéskor): kissé érzékeny / 7

Elszíneződési hajlam: érzékeny / 5,5

Sütési minőség: átlag alatti / 5,5

Száranyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4,5

TGA-szint: 4,73

Karvon olaj: 5-15%-kal több gumó / 6

S\_Dormancy: átlagos / 6,5

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Tápanyag ellátás és gumókezelés<sup>1</sup>

**Nitrogén:** Standard mennyiség. Több ütemben kijuttatva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

**Foszfát:** Standard mennyiség.

**Kálium:** Standard mennyiség.

## Gumókezelés

A fajta lassú kezdeti növekedése miatt csak kellően meleg talajba javasolt ültetni. A csíráltatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére. Rövid hősokk vagy előcsíráztatás ajánlott.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 tő/ha)

## Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombzatot vagy a termést.

## Gombabetegségek ellen

Fitoftóra rezisztencia ellenére a fertőzés tüneteinek rendszeres ellenőrzése javasolt.

## Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

## Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Közepesen hosszú - hosszú ideig tárolható.



## Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: kissé fogékony / 6

Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8,5

Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4,5

Lombfitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 8,5

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 7,5

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5

Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5

A-vírus: - / -

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7,5

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: - / -

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Say potato,  
say Agrico.