CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Riviera.

Kimondottan korai, mutatós héjú, szárazságtűrő, vírusoknak jól ellenálló, bőtermő fajta.

- **Nagyméretű gumók**
- **Gyönyörű kinézet**
- **Vírusoknak jól ellenáll**

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: MINERVA x ALCMARIA

Magonc: BH 86-0266

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: kimondottan korai / 8

Fénycsíra színe: kékes lila / BV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: átlagos / 7

Lombozat - szilárdság: átlagos / 6,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5

Héj szín: sárga / Y

Hús szín: világos sárga / 6

Héj minőség: kiváló / 8

Gumóforma: ovális-kerek / OR

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6

Gumókötésszám: átlag alatti / 5

Gumóméret: átlag feletti / 7,5

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5

Betakarításkori sérülékenység: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Metribuzin - kelés után: nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Bentazon: - / -

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 318

Szárazanyag taratlom: 17,7%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): érzékeny / 5,5

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: nem megfelelő / 4,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 4,8

Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4

S_Dormancy: átlagos / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre.Egynél többszöri csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 ºC. Tárolás nélküli értékesítésre - rövid távú tárolásra alkalmas.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: kissé fogékony / 7
Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 3
Gumó fitoftóra: fogékony / 5
Fuzárium: kissé fogékony / 6
Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5
Poros varasodás: kimondottan fogékony / 2
A-vírus: - / -
X vírus: - / -
Kolletotrichumos megbetegedés: fogékony / 5,5
Ervinia: fogékony / 5
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com