

# Riviera.

Kimondottan korai, mutatós héjú,  
szárazságtűrő, vírusoknak jól ellenálló,  
bőtermő fajta.



Piaci  
szegmens  
- Friss  
piac  
Friss piac

- ▶ **Nagyméretű gumók**
- ▶ **Gyönyörű kinézet**
- ▶ **Vírusoknak jól ellenáll**



## characteristics

### Általános jellemzők

Keresztezés: MINERVA x ALCMARIA  
Magonc: BH 86-0266

### Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: kimondottan korai / 8  
Fénycsíra színe: kékes lila / BV  
Virág színe: fehér / W  
Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4  
Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7  
Lombozat - kifejlett állapot: átlagos / 7  
Lombozat - szilárdság: átlagos / 6,5  
Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5  
Héj színe: sárga / Y  
Hús színe: világos sárga / 6  
Héj minőség: kiváló / 8  
Gumóforma: ovális-kerek / OR  
Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6  
Gumókötésszám: átlag alatti / 5  
Gumóméret: átlag feletti / 7,5  
Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7  
Nyugalmi idő: átlagos / 6

### Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5  
Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8  
Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5  
Betakarításkori sérülékenysége: eléggé érzékeny / 6  
Metribuzin - kelés előtt: nem vagy csak kissé érzékeny / 8  
Metribuzin - kelés után: nem vagy csak kissé érzékeny / 8  
Bentazon: - / -  
Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6  
Vízalatti súly: 318  
Száranyag tartalom: 17,7%  
Főzési típus: nem szétfővő / AB  
Szürkületi hajlam (főzéskor): érzékeny / 5,5  
Elszíneződési hajlam: - / -  
Sütési minőség: nem megfelelő / 4,5  
Száranyag eloszlás: - / -  
Chips minőség: nem megfelelő / 4  
TGA-szint: 4,8  
Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4  
S\_Dormancy: átlagos / 6

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Tápanyag ellátás és gumókezelés<sup>1</sup>

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

## Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre. Egynél többszöri csíráztatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)

## Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

## Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

## Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Tárolás nélküli értékesítésre - rövid távú tárolásra alkalmas.



## Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: kissé fogékony / 7

Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7

Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 3

Gumó fitoftóra: fogékony / 5

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5

Poros varasodás: kimondottan fogékony / 2

A-vírus: - / -

Say potato,  
say Agrico.

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: fogékony / 5,5

Ervinia: fogékony / 5

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -