

Jolene.

Középkorai, jó héjminőségű, otthoni sütésre alkalmas fajta.


- ▶ **Világos sárga hússzín**
- ▶ **Különböző ételekhez alkalmas**
- ▶ **Magas szárazanyag tartalom**



**Piaci szegmens -
Kiskereskedelem**
Friss piac



**Piaci szegmens -
Friss piac**
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: SAGITTA x AR 03-1491

Magonc: AR 09-2556

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: középkorai / 6

Fénycsíra színe: vörös / R

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): átlag alatti / 7

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszúakás / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlag feletti / 7

Gumóméret: átlag feletti / 7,5

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: kissé érzékeny / 7

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenységi: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés után: nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Bentazon: - / -

Etilén: 15-25%-kal több gumó / 7

Vízalatti súly: 389

Szárazanyag tartalom: 21,1%

Főzési típus: kissé szétfővő / B

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5

Elszíneződési hajlam: kissé érzékeny / 7

Sütési minőség: jó / 7

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 5

TGA-szint: 6,9

Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7

S_Dormancy: átlagos / 6

Mutációs hajlam: Ez a fajta mutációra hajlamos, carvone tartalmú szerek használata kerülendő. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. Egynél többszöri csíráztatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4

Gumó fitoftóra: fogékony / 5

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6

Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5

A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7,5

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: - / -

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: - / -

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -