CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Corazon.

Korai, piros héjú, bőtermő étkezési fajta.

- **Kiváló héj minőség**
- **Nem szétfővő**
- **Többféle rezisztencia**

Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: EVOLUTION x MANITOU
Magonc: SW 07-1082

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: korai / 7
Fénycsíra színe: vörös / R
Virág színe: világos lila / LP
Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4
Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5
Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8
Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7
Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7
Héj szín: piros / R
Hús szín: világos sárga / 6
Héj minőség: jó / 7
Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL
Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7
Gumókötésszám: átlag feletti / 7
Gumóméret: átlag feletti / 7
Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6
Nyugalmi idő: rövid / 5,5

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6
Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7,5
Gumórepedés: kissé érzékeny / 7
Betakarításkori sérülékenység: kissé érzékeny / 7
Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7
Metribuzin - kelés után: kimondottan érzékeny / 4
Bentazon: kissé érzékeny / 7
Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6
Vízalatti súly: 321
Szárazanyag taratlom: 17,8%
Főzési típus: nem szétfővő / AB
Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6
Elszíneződési hajlam: - / -
Sütési minőség: átlag alatti / 5,5
Szárazanyag eloszlás: - / -
Chips minőség: nem megfelelő / 4
TGA-szint: 10
Karvon olaj: 25%-kal több gumó / 8
S_Dormancy: rövid / 5,5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre.Egynél többszöri csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

28/35 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem befolyásolja a termést, de elszínezheti a lombozatot.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 ºC. Közepesen hosszú - hosszú ideig tárolható.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: fogékony / 5,5
Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8,5
Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5,5
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6,5
Fuzárium: fogékony / 5,5
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kimondottan fogékony / 4,5
A-vírus: - / -
X vírus: - / -
Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7,5
Ervinia: - / -
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: kissé fogékony / 9
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: ellenálló / 9
R_Golden nematode Ro 5: talajban ellenálló* / 7*
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com