

Corazon.

Korai, piros héjú, bőtermő étkezési fajta.


- ▶ **Kiváló héj minőség**
- ▶ **Nem szétfővő**
- ▶ **Többféle rezisztencia**



**Piaci szegmens -
Kiskereskedelem**
Friss piac



Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: EVOLUTION x MANITOU

Magonc: SW 07-1082

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: korai / 7

Fénycsíra színe: vörös / R

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj szín: piros / R

Hús szín: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszúka / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlag feletti / 7

Gumóméret: átlag feletti / 7

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6

Nyugalmi idő: rövid / 5,5

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7,5

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenység: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7

Metribuzin - kelés után: kimondottan érzékeny / 4

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 321

Száranyag tartalom: 17,8%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: átlag alatti / 5,5

Száranyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 10

Karvon olaj: 25%-kal több gumó / 8

S_Dormancy: rövid / 5,5

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre. Egynél többszöri csíráztatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 tő/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem befolyásolja a termést, de elszínezhetheti a lombzatot.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Közepesen hosszú - hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: fogékony / 5,5
Yn vírus (gumó): nem vagy csak kissé fogékony / 8,5
Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5,5
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6,5
Fuzárium: fogékony / 5,5
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kimondottan fogékony / 4,5
A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: - / -
Kolleotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7,5
Ervinia: - / -
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: kissé fogékony / 9
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: ellenálló / 9
R_Golden nematode Ro 5: talajban ellenálló* / 7*
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -