


Paradiso.

Középkorai, nagy gumókat nevelő,
bőtermő, friss piaci fajta.

- ▶ **Nagyméretű gumók**
- ▶ **Gyönyörű kinézet**
- ▶ **Jól tűri a mechanikai sérüléseket**



**Piaci
szegmens
- Friss
piac
Friss piac**



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: RODEO x VALOR

Magonc: PK 06-0108

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: középkorai / 6

Fénycsíra színe: vörös / R

Virág színe: lila / P

Bogyók száma (termés): átlag alatti / 6,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: dús / 7,5

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: világos sárga / 6

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernöves: kissé érzékeny / 7

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7,5

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5

Betakarításkori sérülékenysége: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés előtt: nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Metribuzin - kelés után: eléggé érzékeny / 6,5

Bentazon: eléggé érzékeny / 6,5

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 329

Szárazanyag tartalom: 18,2%

Főzési típus: kissé szétfővő / B

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: nem megfelelő / 4,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 4,8

Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4

S_Dormancy: átlagos / 6

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség - 20%.Több ütemben kijutattva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

A csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 tő/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés javasolt.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: kissé fogékony / 6

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7,5

Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4

Lombfitoftóra: fogékony / 5,5

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6,5

Fuzárium: fogékony / 5

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5

Poros varasodás: kissé fogékony / 7,5

A-vírus: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: fogékony / 5,5

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -