

Twinner.

Korán termő, hagyományos és bio termelésre is alkalmas, gumó- és lombfitoftóra rezisztens fajta.

- ▶ **Nagyméretű gumók**
- ▶ **Gyönyörű kinézet**
- ▶ **Nem szétfővő**



Piaci szegmens - Bio
Bio



Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac



Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: MA 98-0032 x AR 00-87-22

Magonc: TW 07-0807

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: nagyon korai / 7,5

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): magas / 4,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: átlagos / 7

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj színe: sárga / Y

Hús színe: sárga / 7

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális / O

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlag alatti / 5

Gumóméret: átlag feletti / 7,5

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7,5

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenysége: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7,5

Metribuzin - kelés után: érzékeny / 5,5

Bentazon: kissé érzékeny / 7,5

Etilén: 15-25%-kal több gumó / 7

Vízalatti súly: 359

Száranyag tartalom: 19,7%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5

Elszíneződési hajlam: eléggé érzékeny / 6

Sütési minőség: átlag feletti / 6,5

Száranyag eloszlás: kiváló / 8

Chips minőség: nem megfelelő / 5

TGA-szint: 7,8

Karvon olaj: 25%-kal több gumó / 8

S_Dormancy: átlagos / 6

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés

1

Nitrogén: Standard mennyiség + 15%. Több ütemben kijuttatva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. A fajta lassú kezdeti növekedése miatt csak kellően meleg talajba javasolt ültetni.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 tő/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra rezisztencia ellenére a fertőzés tüneteinek rendszeres ellenőrése javasolt.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Közepesen hosszú ideig tárolható.



Say potato,
say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: kissé fogékony / 6,5

Yn vírus (gumó): fogékony / 5

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6

Lombfitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Gumó fitoftóra: nem vagy csak kissé fogékony / 9

Fuzárium: kissé fogékony / 6

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5

Poros varasodás: kimondottan fogékony / 4

A-vírus: - / -

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 6,5

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -