

Meryem.

Kései, bőtermő, gyönyörű piros héjú fajta.

- ▶ Jó szárazságtűrő képesség
- ▶ Jó gumókötésszám
- ▶ Jó vírus rezisztencia



Piaci szegmens
- Friss piac
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztelés: LUSA x AR 01-0420

Magonc: AR 08-4009

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: kései / 5

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): átlag alatti / 6,5

Lombozat - kezdeti fejlődés: kimondottan gyors / 8

Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj szín: piros / R

Hús szín: világos sárga / 6,5

Héj minőség: átlag feletti / 6,5

Gumóforma: hosszúkás-ovális / LO

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: átlag feletti / 7

Gumóméret: átlag feletti / 7,5

Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Nyugalmi idő: kimondottan rövid / 4

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7

Gumórepedés: kissé érzékeny / 7

Betakarításkori sérülékenységi: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5

Bentazon: - / -

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 349

Szárazanyag tartalom: 19,2%

Főzési típus: kissé szétfővő / B

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: átlag alatti / 5,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 3,3

Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4

S_Dormancy: kimondottan rövid / 4

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 20%.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. Egynél többszöri csíráztatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem károsítja a lombozatot vagy a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 °C. Rövid - közepesen hosszú ideig tárolható.



Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: kissé fogékony / 6,5

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7,5

Dohány (rattle) vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 9

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4,5

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6

Fuzárium: fogékony / 5

Sugárgombás varasodás: fogékony / 5,5

Poros varasodás: kissé fogékony / 6

A-vírus: - / -

Say potato,
say Agrico.

X vírus: - / -

Kolletotrichumos megbetegedés: nem vagy csak kissé fogékony / 8

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: kissé fogékony / 9

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: - / -

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -