

Ranomi.

Korai bőtermő fajta, sugárgombás varasodásnak viszonylag jól ellenáll.

- ▶ Szép küllemű héj
- ▶ Nagyméretű gumók
- ▶ Nem szétfővő



**Piaci szegmens -
Kiskereskedelem**
Friss piac



**Piaci szegmens -
Friss piac**
Friss piac



characteristics

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Magonc: AR 03-0221

Növény és gumó jellemzők

Érés csoport: nagyon korai / 7,5

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: fehér / W

Bogyók száma (termés): átlagos / 6

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5

Lombozat - kifejlett állapot: átlagos / 7

Lombozat - szilárdság: átlagos / 6,5

Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6

Héj szín: sárga / Y

Hús szín: világos sárga / 6,5

Héj minőség: jó / 7

Gumóforma: ovális-hosszúakás / OL

Gumóforma egyenletessége: szabályos / 7

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: átlag feletti / 7

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövé: eléggé érzékeny / 6

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6,5

Betakarításkori sérülékenységi: eléggé érzékeny / 6

Metribuzin - kelés előtt: érzékeny / 5

Metribuzin - kelés után: eléggé érzékeny / 6

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6

Vízalatti súly: 322

Szárazanyag tartalom: 17,9%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6

Elszíneződési hajlam: - / -

Sütési minőség: átlag feletti / 6,5

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 5

TGA-szint: 4,08

Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7

S_Dormancy: átlagos / 6

How to grow



www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés¹

Nitrogén: Standard mennyiség. Több ütemben kijuttatva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető. Egynél többszöri csíráztatás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4 °C. Tárolás nélküli értékesítésre - rövid távú tárolásra alkalmas.



Say potato,
say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -

Yn vírus: fogékony / 5,5

Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 6

Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 6,5

Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4

Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6

Fuzárium: fogékony / 5

Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6,5

Poros varasodás: kimondottan fogékony / 4,5

A-vírus: - / -

X vírus: fogékony / 5,5

Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7

Ervinia: - / -

Burgonyarák F1: nem fogékony / 10

Burgonyarák F6: - / -

Burgonyarák F18: - / -

Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9

Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -

Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -