

Vogue.



Tradizionale

Varietà semi-precoce da consumo con tuberi dal calibro elevato ed uniforme.

- ▶ **Polpa compatta dopo la cottura**
- ▶ **Tuberi di elevato calibro**
- ▶ **Varietà caratterizzata da tuberizzazione precoce**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Konst Research B.V.
 Incrocio: MARABEL x AMOROSA
 Diritti dei selezionatori: 31-12-2046
 Plantula: KO 03-2027

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 6,5
 Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: verde rosso / GR
 Colore dei fiori: bianco / W
 Numero di bacche: molto alto / 4
 Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7
 Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono / 7,5
 Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7
 Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6
 Colore della buccia: giallo / Y
 Colore della polpa: giallo / 7
 Finitura della buccia: media / 6
 Forma del tubero: ovale lunga / OL
 Regolarità della forma del tubero: regolare / 7
 Tuberizzazione: abbastanza bassa / 5,5
 Calibro del tubero: grosso / 8
 Regolarità del calibro: regolare / 7
 Dormienza: abbastanza breve / 5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5
 Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8
 Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6,5
 Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6
 Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8
 Metribuzin: poco sensibile / 7,5
 Bentazone: poco sensibile / 7
 Etilene: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5
 Peso in acqua: 311
 Contenuto in sostanza secca: 17,3%
 Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB
 Scolorimento grigio (dopo la cottura): poco sensibile / 7,5
 Scolorimento da cruda: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 5
 Distribuzione della sostanza secca: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4
 Livello di GAT: 3,7
 Olio di cumino: più del 25% dei tuberi / 8
 Dormienza: abbastanza breve / 5



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard - 10%. Preferibile applicazione frazionata, secondo trattamento subito dopo la tuberizzazione.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Adatta alla distribuzione direttamente dal



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: poco suscettibile / 6,5

Virus - Yntn (tubero): suscettibile / 5

Necrosi anulare del tubero: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 6

Fusarium: poco suscettibile / 6,5

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 2

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: molto suscettibile / 4,5

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: poco suscettibile / 9

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -