

Melrose.

Varietà di patata da consumo precoce, versatile e dal sapore deciso.




Trasformazione
IV gamma



Dettaglio
Fresco
Speciali

- ▮ **Buccia rosso chiaro**
- ▮ **Pasta gialla**
- ▮ **Polpa farinosa dopo la cottura**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: C.R.A.

Incrocio: BP 15.7.70 x AM 15.1.68

Diritti dei selezionatori: 31-12-2042

Plantula: ISCI 12/01-5

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce:
- / -

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: - / -

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: medio / 6,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono
/ 7,5

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo / 7

Finitura della buccia: sopra la media / 6,5

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: alta / 8

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): abbastanza
sensibile / 6

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: - / -

Etilene: - / -

Peso in acqua: 406

Contenuto in sostanza secca: 22%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza
sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: molto sensibile / 4,5

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino:
sopra la media / 6,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non
adatta / 5

Livello di GAT: 9,5

Olio di cumino: meno del 5% dei tuberi / 4

Dormienza: media / 6



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Si consiglia breve shock termico o adeguato pregermogliamenti. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 20 cm (67.000 piante/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Adatta alla conservazione a medio termine.



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: - / -

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: - / -

Fusarium: - / -

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: - / -

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: moderatamente suscettibile / 7

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -