CULTIVATION RECOMMENDATION

Agria.

Varietà di patata da trasformazione a maturazione media, a pasta gialla, con buona resa e qualità molto stabile.

Biologico
Biologica

Trasformazione
Patatine a bastoncino
Patatine a sfoglia
IV gamma

Dettaglio
Fresco

Tradizionale

- **Ottima qualità in frittura**
- **Resistenza a diversi virus**
- **Ottima capacità di conservazione**

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Böhm

Incrocio: QUARTA x SEMLO

Diritti dei selezionatori: Scaduto

Plantula: BM 77-0945

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: tardiva / 5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: assenti / 8

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo / 7

Finitura della buccia: media / 6

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: abbastanza bassa / 5

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: lunga / 8

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6

Black spot (annerimento interno): abbastanza sensibile / 6

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6,5

Danneggiamento da raccolta: sensibile / 5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: abbastanza sensibile / 6,5

Etilene: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Peso in acqua: 402

Contenuto in sostanza secca: 21,8%

Consistenza in cottura: farinosa / BC

Scolorimento grigio (dopo la cottura): poco sensibile / 7

Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: eccellente / 8

Distribuzione della sostanza secca: media / 6,5

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: buona / 7

Livello di GAT: 2,7

Olio di cumino: più del 25% dei tuberi / 8

Dormienza: lunga / 8

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione [1]

Azoto: raccomandazione standard - 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Si consiglia breve shock termico o adeguato pregermogliamento.Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli.

Distanza di semina

28/35 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e raramente una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Per le varietà destinate all'industria di

Say potato, say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: poco suscettibile / 6

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 7

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5,5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 7

Fusarium: poco suscettibile / 6,5

Scabbia comune: molto suscettibile / 4,5

Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 3

Virus - A: suscettibilità scarsa o assente / 9

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: - / -

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: poco suscettibile / 9

Rogna nera F6: abbastanza suscettibile / 6

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: suscettibile / 2

Nematode bianco Pa 3: suscettibile / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com