

Agria.

Varietà di patata da trasformazione a maturazione media, a pasta gialla, con buona resa e qualità molto stabile.

- » **Ottima qualità in frittura**
- » **Resistenza a diversi virus**
- » **Ottima capacità di conservazione**



Biologico
Biologica



Trasformazione
Patatine a bastoncino
Patine a sfoglia
IV gamma



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Böhm

Incrocio: QUARTA x SEMLO

Diritti dei selezionatori: Scaduto

Plantula: BM 77-0945

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: tardiva / 5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: assenti / 8

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo / 7

Finitura della buccia: media / 6

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: abbastanza bassa / 5

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: lunga / 8

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6

Black spot (annerimento interno): abbastanza sensibile / 6

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6,5

Danneggiamento da raccolta: sensibile / 5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: abbastanza sensibile / 6,5

Etilene: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Peso in acqua: 402

Contenuto in sostanza secca: 21,8%

Consistenza in cottura: farinosa / BC

Scolorimento grigio (dopo la cottura): poco sensibile / 7

Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: eccellente / 8

Distribuzione della sostanza secca: media / 6,5

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: buona / 7

Livello di GAT: 2,7

Olio di cumino: più del 25% dei tuberi / 8

Dormienza: lunga / 8

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard - 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Si consiglia breve shock termico o adeguato pregermogliamento. Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli.

Distanza di semina

28/35 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e raramente una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Per le varietà destinate all'industria di



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: poco suscettibile / 6

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 7

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5,5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 7

Fusarium: poco suscettibile / 6,5

Scabbia comune: molto suscettibile / 4,5

Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 3

Virus - A: suscettibilità scarsa o assente / 9

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: - / -

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: poco suscettibile / 9

Rogna nera F6: abbastanza suscettibile / 6

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: suscettibile / 2

Nematode bianco Pa 3: suscettibile / 2