

Alouette.

Varietà di patata da consumo precoce, versatile, a buccia rossa, resistente alla peronospora del fogliame e dei tuberi, adatta alla produzione biologica e convenzionale.

- » Buona tolleranza all'annerimento
- » Adatta alla cottura in forno
- » Buona tolleranza alla siccità



Biologico
Biologica



Trasformazione
IV gamma



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.

Incrocio: AR 02-139-1 x LAURA

Diritti dei selezionatori: 31-12-2044

Plantula: AR 04-3153

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: violetto / LP

Numero di bacche: molto alto / 4

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: rapido / 8

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo / 7,5

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: media / 6

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6,5

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6,5

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Metribuzin: poco sensibile / 7

Bentazone: poco sensibile / 7

Etilene: meno del 5% dei tuberi / 4

Peso in acqua: 389

Contenuto in sostanza secca: 21,1%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): poco sensibile / 7

Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sopra la media / 6,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: - / -

Livello di GAT: 3,6

Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Dormienza: media / 6

Tasso di mutazione: Questa varietà può mostrare un elevato tasso di mutazione. Pertanto, l'uso dell'olio di cumino è sconsigliato. / Use of carvone oil can provoke mutations.



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 20%.

Trattamento del seme

La semina dei tuberi deve avvenire preferibilmente in terreno riscaldato, perché questa varietà ha un lento sviluppo iniziale. Un adeguato pregermogliamentamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 20 cm (67.000 piante/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

Fungicidi

Nonostante la resistenza alla peronospora, si consiglia di intervenire con trattamenti preventivi.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Per le varietà destinate all'industria di trasformazione, non conservare al di sotto di 7 °C.



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5,5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibilità scarsa o assente / 9

Peronospora tardiva-tubero: suscettibilità scarsa o assente / 9

Fusarium: poco suscettibile / 7,5

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia pulverulenta: poco suscettibile / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: poco suscettibile / 7

Antracnosi: - / -

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: resistente in campo / 8

R_Golden nematode Ro 5: moderatamente suscettibile* / 6*

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -