

Arizona.



Tradizionale

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, con resa elevata in diverse condizioni climatiche.

- ▶ **Resa elevata precoce**
- ▶ **Buona tolleranza alla siccità e al calore**
- ▶ **Forte resistenza ai virus**
- ▶ **Ottime prestazioni in ogni clima**



characteristics

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.
 Incrocio: UK 150-19D22 x MASCOTTE
 Diritti dei selezionatori: 31-12-2040
 Plantula: AR 98-0313

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7
 Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV
 Colore dei fiori: bianco / W
 Numero di bacche: sopra la media / 5
 Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7
 Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8
 Apparato fogliare - Robustezza: media / 6
 Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5
 Colore della buccia: giallo / Y
 Colore della polpa: giallo paglierino / 6
 Finitura della buccia: sopra la media / 6,5
 Forma del tubero: ovale / O
 Regolarità della forma del tubero: regolare / 7,5
 Tuberizzazione: media / 6
 Calibro del tubero: grosso / 8
 Regolarità del calibro: regolare / 7
 Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7
 Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7
 Crepe di crescita: poco sensibile / 7
 Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7
 Metribuzin: sensibile / 5
 Metribuzin: abbastanza sensibile / 6,5
 Bentazone: poco sensibile / 7
 Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7
 Peso in acqua: 301
 Contenuto in sostanza secca: 17%
 Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB
 Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5
 Scolorimento da cruda: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 4
 Distribuzione della sostanza secca: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4
 Livello di GAT: 4,2
 Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6
 Dormienza: media / 6



How to grow

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard - 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4 °C. Adatta alla conservazione a medio termine.



**Say potato,
say Agrico.**

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: suscettibile / 5,5

Scabbia pulverulenta: molto suscettibile / 2

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: molto suscettibile / 4

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: abbastanza suscettibile / 6

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -