CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Arizona.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, con resa elevata in diverse condizioni climatiche.

- **Resa elevata precoce**
- **Buona tolleranza alla siccità e al calore**
- **Forte resistenza ai virus**
- **Ottime prestazioni in ogni clima**

Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.
Incrocio: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Diritti dei selezionatori: 31-12-2040
Plantula: AR 98-0313

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7
Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV
Colore dei fiori: bianco / W
Numero di bacche: sopra la media / 5
Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7
Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8
Apparato fogliare - Robustezza: media / 6
Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5
Colore della buccia: giallo / Y
Colore della polpa: giallo paglierino / 6
Finitura della buccia: sopra la media / 6,5
Forma del tubero: ovale / O
Regolarità della forma del tubero: regolare / 7,5
Tuberizzazione: media / 6
Calibro del tubero: grosso / 8
Regolarità del calibro: regolare / 7
Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7
Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7
Crepe di crescita: poco sensibile / 7
Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7
Metribuzin: sensibile / 5
Metribuzin: abbastanza sensibile / 6,5
Bentazone: poco sensibile / 7
Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7
Peso in acqua: 301
Contenuto in sostanza secca: 17%
Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB
Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5
Scolorimento da cruda: - / -
Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 4
Distribuzione della sostanza secca: - / -
Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4
Livello di GAT: 4,2
Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6
Dormienza: media / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione [1]

Azoto: raccomandazione standard - 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4



Say potato, say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: suscettibile / 5,5

Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 2

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: molto suscettibile / 4

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: abbastanza suscettibile / 6

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com