

Artemis.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, con resa eccellente, perfetta per le patatine fritte fatte in casa.


- » **Ottima qualità per la frittura**
- » **Buona tolleranza a danni e ammaccature**
- » **Resistenze multiple**



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.

Incrocio: RIANITA x RENSKA

Diritti dei selezionatori: 31-12-2029

Plantula: AR 87-0039

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: verde / G

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: molto alto / 4

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: medio / 7

Apparato fogliare - Robustezza: media / 6

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: abbastanza breve / 5,5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6,5

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Bentazone: - / -

Etilene: - / -

Peso in acqua: 375

Contenuto in sostanza secca: 20,4%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6

Scolorimento da cruda: - / -

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: media / 6

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: media / 6

Livello di GAT: 4,9

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: abbastanza breve / 5,5

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

La semina dei tuberi deve avvenire preferibilmente in terreno riscaldato, perché questa varietà ha un lento sviluppo iniziale. Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: poco suscettibile / 7

Virus - Yn: poco suscettibile / 6,5

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-tubero: suscettibilità scarsa o assente / 8

Fusarium: suscettibile / 5

Scabbia comune: suscettibile / 5,5

Scabbia pulverulenta: suscettibile / 5,5

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibile / 5,5

Antracnosi: poco suscettibile / 7

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -