

Esmee.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, con bella buccia rossa, buona tolleranza al calore e buona resa.



Dettaglio
Fresco



Tradizionale

- » **Bellissimo aspetto della buccia**
- » **Tuberi di elevato calibro**
- » **Resistenza a diversi virus**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.

Incrocio: LAURA x RODEO

Diritti dei selezionatori: 31-12-2043

Plantula: AR 01-0410

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 6,5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: violetto / LP

Numero di bacche: molto alto / 4

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono / 7,5

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo / 7

Finitura della buccia: eccellente / 8

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6,5

Tuberizzazione: media / 6

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6,5

Metribuzin: molto sensibile / 4

Metribuzin: poco sensibile / 7

Bentazone: poco sensibile / 7

Etilene: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5

Peso in acqua: 326

Contenuto in sostanza secca: 18%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): sensibile / 5,5

Scolorimento da cruda: abbastanza sensibile / 6

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: media / 6

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 8,2

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: media / 6



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4,5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 7

Fusarium: poco suscettibile / 7

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia pulverulenta: poco suscettibile / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 8

Antracnosi: suscettibile / 5,5

Erwinia: poco suscettibile / 7

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -