

Kuroda.



Tradizionale

Varietà di patata da consumo precoce, a buccia rossa, eccellente tolleranza al calore e ottima resa.

- » **Tuberi di grandi dimensioni**
- » **Buona conservabilità**
- » **Resistenze multiple alla verruca della patata**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: G. Kuik

Incrocio: AR 76-199-03 x KO 80-1407

Diritti dei selezionatori: 31-12-2025

Plantula: KK 83-0216

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV

Colore dei fiori: porpora / P

Numero di bacche: medio / 6

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6,5

Tuberizzazione: abbastanza bassa / 5

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: lunga / 8

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): abbastanza sensibile / 6

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: sensibile / 5

Metribuzin: sensibile / 5

Metribuzin: sensibile / 5

Bentazone: - / -

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 426

Contenuto in sostanza secca: 23%

Consistenza in cottura: farinosa / BC

Scolorimento grigio (dopo la cottura): molto sensibile / 4,5

Scolorimento da cruda: - / -

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sotto la media / 5,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 5

Livello di GAT: -

Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Dormienza: lunga / 8

Consigli di coltivazione



Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 20%.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme effettuata una sola volta è facoltativa.

Distanza di semina

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: poco suscettibile / 6

Virus - Yn: poco suscettibile / 7

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 7

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5

Fusarium: suscettibilità scarsa o assente / 8

Scabbia comune: suscettibile / 5

Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 2

Virus - A: suscettibilità scarsa o assente / 9

Virus - X: suscettibile / 5,5

Antracnosi: - / -

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: poco suscettibile / 9

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -