

Rudolph.



Tradizionale

Varietà di patata da consumo precoce,
con buccia rossa attraente, buona
tolleranza al calore e resa molto elevata.

- » **Pasta bianca**
- » **Tuberi di elevato calibro**
- » **Ottima capacità di conservazione**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.
Incrocio: CHIEFTAIN x STIRLING
Diritti dei selezionatori: 31-12-2035
Plantula: UK 93-1-2

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 5,5
Colore dei germogli in determinate condizioni di luce:
rosso viola / RV
Colore dei fiori: violetto / LP
Numero di bacche: medio / 6
Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: medio / 6
Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8
Apparato fogliare - Robustezza: robusto / 8
Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5
Colore della buccia: rosso / R
Colore della polpa: bianco / 4
Finitura della buccia: buona / 7
Forma del tubero: ovale tonda / OR
Regolarità della forma del tubero: abbastanza
regolare / 6
Tuberizzazione: abbastanza bassa / 5
Calibro del tubero: grosso / 8
Regolarità del calibro: regolare / 7
Dormienza: abbastanza lunga / 7

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5
Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7
Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6
Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6
Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8
Metribuzin: poco sensibile / 7,5
Bentazone: - / -
Etilene: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6
Peso in acqua: 376
Contenuto in sostanza secca: 20,5%
Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB
Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza
sensibile / 6,5
Scolorimento da cruda: - / -
Qualità per la produzione di patatine a bastoncino:
sopra la media / 6,5
Distribuzione della sostanza secca: - / -
Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: sotto
la media / 5,5
Livello di GAT: 5,5
Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7
Dormienza: abbastanza lunga / 7,5



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 5%. Preferibile applicazione frazionata, secondo trattamento subito dopo la tuberizzazione.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Si consiglia breve shock termico o adeguato pregermogliamento. Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme effettuata una sola volta è facoltativa.

Distanza di semina

28/35 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibile / 5

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 7

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5,5

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5,5

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: suscettibile / 5

Scabbia polverulenta: poco suscettibile / 7

Virus - A: - / -

Virus - X: poco suscettibile / 6

Antracnosi: poco suscettibile / 7

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: moderatamente suscettibile / 8

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -