

Spectra.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, ad alto rendimento, con tuberi di forma molto regolare e buccia liscia e attraente.


- ▶ **Tuberi di grandi dimensioni**
- ▶ **Buona tuberizzazione**
- ▶ **Forma uniforme dei tuberi**



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Lantmännen Seed B.V.

Incrocio: ARIELLE x SOFIA

Diritti dei selezionatori: 31-12-2046

Plantula: SW 05-1431

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: molto alto / 4

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: rapido / 8

Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono / 7,5

Apparato fogliare - Robustezza: media / 6,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: molto buona / 7,5

Forma del tubero: ovale tonda / OR

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7,5

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7,5

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6,5

Dormienza: abbastanza breve / 5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7,5

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: poco sensibile / 7

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: sensibilità scarsa o assente / 8

Etilene: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5

Peso in acqua: 324

Contenuto in sostanza secca: 17,9%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6

Scolorimento da cruda: molto sensibile / 4

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 4,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 4,7

Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Dormienza: abbastanza breve / 5



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

Plant Spectra a bit deeper than other varieties to avoid green tubers.

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: poco suscettibile / 6

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4,5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 6

Fusarium: suscettibile / 5,5

Scabbia comune: suscettibile / 5

Scabbia pulverulenta: molto suscettibile / 4

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: suscettibile / 5

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -