

Twister.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, per coltivazione convenzionale e biologica, con buona resa e resistente alla peronospora del fogliame e dei tuberi.

- ▶ **Ottimo aspetto della buccia**
- ▶ **Ottima capacità di conservazione**
- ▶ **Polpa compatta dopo la cottura**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: G.W. te Winkel

Incrocio: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Diritti dei selezionatori: 31-12-2048

Plantula: TW 08-1507

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: violetto / LP

Numero di bacche: sopra la media / 5,5

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono / 7,5

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6,5

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: tonda ovale / RO

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: media / 6,5

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6,5

Dormienza: abbastanza lunga / 7

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6,5

Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7

Metribuzin: molto sensibile / 3

Metribuzin: molto sensibile / 3

Bentazone: abbastanza sensibile / 6

Etilene: meno del 5% dei tuberi / 4

Peso in acqua: 345

Contenuto in sostanza secca: 19%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: abbastanza sensibile / 6

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 5,63

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: abbastanza lunga / 7



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 20%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme effettuata una sola volta è facoltativa.

Distanza di semina

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

Nonostante la resistenza alla peronospora, si consiglia di intervenire con trattamenti preventivi.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 6 °C. Adatta alla conservazione a medio e lungo



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibilità scarsa o assente / 9

Peronospora tardiva-tubero: suscettibilità scarsa o assente / 9

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: suscettibile / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: poco suscettibile / 7

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: moderatamente suscettibile / 8

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -