

Jolene.

Varietà di patata da consumo precoce, con buona finitura della buccia e adatta alla frittura domestica.


- » **Varietà multiuso**
- » **Bella finitura della buccia**
- » **Tuberi uniformi**
- » **Forte resistenza ai virus**



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.

Incrocio: SAGITTA x AR 03-1491

Diritti dei selezionatori: 31-12-2050

Plantula: AR 09-2556

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso / R

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: sotto la media / 7

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7,5

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6,5

Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8

Bentazone: - / -

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 389

Contenuto in sostanza secca: 21,1%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: buona / 7

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 5

Livello di GAT: 6,9

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: media / 6

Tasso di mutazione: Questa varietà può mostrare un elevato tasso di mutazione. Pertanto, l'uso dell'olio di cumino è sconsigliato. / Use of carvone oil can provoke mutations.



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: poco suscettibile / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: poco suscettibile / 7,5

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: - / -

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -