CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Jolene.

Varietà di patata da consumo precoce, con buona finitura della buccia e adatta alla frittura domestica.

- **Varietà multiuso**
- **Bella finitura della buccia**
- **Tuberi uniformi**
- **Forte resistenza ai virus**

Dettaglio Fresco

Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.

Incrocio: SAGITTA x AR 03-1491

Diritti dei selezionatori: 31-12-2050

Plantula: AR 09-2556

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso / R

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: sotto la media / 7

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: ovale lunga / OL

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7,5

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6,5

Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8

Bentazone: - / -

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 389

Contenuto in sostanza secca: 21,1%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: buona / 7

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 5

Livello di GAT: 6,9

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: media / 6

Tasso di mutazione: Questa varietà può mostrare un elevato tasso di mutazione. Pertanto, l'uso dell'olio di cumino è sconsigliato. / Use of carvone oil can provoke mutations.

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione [1]

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico.La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato, say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: suscettibile / 5

Fusarium: poco suscettibile / 6

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: poco suscettibile / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: poco suscettibile / 7,5

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: - / -

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com