

Manitou.

Varietà di patata da consumo a maturazione media, con bella buccia rossa e ad alto rendimento.

- » **Tuberi di elevato calibro**
- » **Buona tolleranza alla siccità**
- » **Resistenza multipla ai nematodi cisticoli della patata**



Dettaglio
Fresco



Tradizionale



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Incrocio: LAURA x MARANCA

Diritti dei selezionatori: 31-12-2037

Plantula: MA 96-0419

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: tardiva / 5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: porpora / P

Numero di bacche: sopra la media / 5

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: buona / 7

Forma del tubero: lunga ovale / LO

Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6,5

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: abbastanza breve / 5,5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7,5

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: sensibile / 5,5

Metribuzin: molto sensibile / 4

Metribuzin: molto sensibile / 3,5

Bentazone: poco sensibile / 7

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 351

Contenuto in sostanza secca: 19,4%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): poco sensibile / 7

Scolorimento da cruda: - / -

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sotto la media / 5,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4,5

Livello di GAT: 3,4

Olio di cumino: meno del 5% dei tuberi / 4

Dormienza: abbastanza breve / 5,5



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, non utilizzare metribuzin (Sencor) perché determina una grave reazione sull'apparato fogliare e una notevole riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: poco suscettibile / 6,5

Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 7

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 7

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 6

Fusarium: poco suscettibile / 7

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: poco suscettibile / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: poco suscettibile / 7

Antracnosi: poco suscettibile / 7

Erwinia: poco suscettibile / 6

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: resistente / 9

R_Golden nematode Ro 5: resistente in campo* / 7*

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -