

# Fontane.

Varietà di patata da trasformazione precoce, ad alto rendimento, per la produzione di patatine fritte e fiocchi.



## Trasformazione

Patatine a bastoncino  
Patatine a sfoglia  
Fiocchi di patate

- » **Tuberi di elevato calibro**
- » **Alto contenuto in sostanza secca**
- » **Adatta a varie tipologie di terreno**



## Caratteristiche

### Caratteristiche generali

Selezionatore: Lantmännen Seed B.V.

Incrocio: AGRIA x AR 76-034-03

Diritti dei selezionatori: 31-12-2028

Plantula: SW 87-1140

### Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 5,5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: sopra la media / 5

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: medio / 7

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6,5

Finitura della buccia: molto scarsa / 5

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6,5

Tuberizzazione: abbastanza alta / 7

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6

Dormienza: abbastanza breve / 5,5

### Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6

Black spot (annerimento interno): abbastanza sensibile / 6

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8

Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8

Bentazone: abbastanza sensibile / 6

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 430

Contenuto in sostanza secca: 23,2%

Consistenza in cottura: farinosa / BC

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: sensibile / 5,5

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: molto buona / 7,5

Distribuzione della sostanza secca: media / 6,5

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: media / 6

Livello di GAT: 6,1

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: abbastanza breve / 5,5



# Consigli di coltivazione

## Fertilizzazione <sup>1</sup>

**Azoto:** raccomandazione standard + 30%. È possibile utilizzare stallatico biologico.

**Fosfato:** raccomandazione standard.

**Potassio:** raccomandazione standard + 10%.

## Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme per più di due volte può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

## Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 piante/ha)

## Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

## Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

## Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

## Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Per le varietà destinate all'industria di



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenze

**Virus - Accartocciamento fogliare:** poco suscettibile / 6

**Virus - Yn:** suscettibile / 5,5

**Virus - Yntn (tubero):** poco suscettibile / 7

**Necrosi anulare del tubero:** poco suscettibile / 6,5

**Peronospora tardiva-apparato fogliare:** suscettibile / 5

**Peronospora tardiva-tubero:** poco suscettibile / 6,5

**Fusarium:** poco suscettibile / 6

**Scabbia comune:** poco suscettibile / 6

**Scabbia polverulenta:** poco suscettibile / 6

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** poco suscettibile / 7

**Antracnosi:** - / -

**Erwinia:** poco suscettibile / 6

**Rogna nera F1:** abbastanza suscettibile / 6

**Rogna nera F6:** moderatamente suscettibile / 8

**Rogna nera F18:** - / -

**Nematode dorato Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematode dorato Ro 2/3:** - / -

**Nematode bianco Pa 2:** - / -

**Nematode bianco Pa 3:** - / -