

Agata.

Varietà di patata da consumo precocissima, a pasta abbastanza soda, con buccia liscia e attraente e resa elevata.



Dettaglio
Fresco



Tradizionale

- ▶ **Tubero di forma e calibro uniforme**
- ▶ **Buona resistenza ai virus**
- ▶ **Buona tolleranza all'annerimento e al danneggiamento**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Lantmännen Seed B.V.

Incrocio: BM 72-0052 x SIRCO

Diritti dei selezionatori: Scaduto

Plantula: GE 77-0134

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: precocissima / 8

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: sopra la media / 5

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: rapido / 8

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: media / 6

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: eccellente / 8

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: alta / 8

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6

Dormienza: breve / 4

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Bentazone: - / -

Etilene: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5

Peso in acqua: 316

Contenuto in sostanza secca: 17,6%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6

Scolorimento da cruda: abbastanza sensibile / 6,5

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 4

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 8

Olio di cumino: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5

Dormienza: breve / 4



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 20%. Preferibile applicazione frazionata, secondo trattamento subito dopo la tuberizzazione.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 20 cm (67.000 piante/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: poco suscettibile / 6

Virus - Yn: poco suscettibile / 7

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6,5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 6

Fusarium: suscettibile / 5

Scabbia comune: suscettibile / 5

Scabbia polverulenta: poco suscettibile / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibile / 5

Antracnosi: poco suscettibile / 6,5

Erwinia: suscettibile / 5

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -