

Corazon.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, a buccia rossa, con resa precoce e buona.




Dettaglio
Fresco



Tradizionale

- » **Ottima qualità della buccia**
- » **Cottura soda**
- » **Resistenze multiple**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Lantmännen Seed B.V.
 Incrocio: EVOLUTION x MANITOU
 Diritti dei selezionatori: 31-12-2048
 Plantula: SW 07-1082

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7
 Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso / R
 Colore dei fiori: violetto / LP
 Numero di bacche: molto alto / 4
 Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5
 Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8
 Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7
 Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7
 Colore della buccia: rosso / R
 Colore della polpa: giallo paglierino / 6
 Finitura della buccia: buona / 7
 Forma del tubero: ovale lunga / OL
 Regolarità della forma del tubero: regolare / 7
 Tuberizzazione: abbastanza alta / 7
 Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7
 Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6
 Dormienza: abbastanza breve / 5,5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6
 Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7,5
 Crepe di crescita: poco sensibile / 7
 Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7
 Metribuzin: poco sensibile / 7
 Metribuzin: molto sensibile / 4
 Bentazone: poco sensibile / 7
 Etilene: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6
 Peso in acqua: 321
 Contenuto in sostanza secca: 17,8%
 Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB
 Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6
 Scolorimento da cruda: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sotto la media / 5,5
 Distribuzione della sostanza secca: - / -
 Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4
 Livello di GAT: 10
 Olio di cumino: più del 25% dei tuberi / 8
 Dormienza: abbastanza breve / 5,5



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 10%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e raramente una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibile / 5,5

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8,5

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5,5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4,5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 6,5

Fusarium: suscettibile / 5,5

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia pulverulenta: molto suscettibile / 4,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: poco suscettibile / 7,5

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: poco suscettibile / 9

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: resistente / 9

R_Golden nematode Ro 5: resistente in campo* / 7*

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -