

Picasso.



Tradizionale

Varietà di patata da consumo a maturazione media, a buccia gialla, occhi rossi prominenti, buona resistenza alla scabbia comune e adatta alla conservazione a lungo termine.

- » **Alta resa**
- » **Buona tolleranza alla siccità**
- » **Buona tolleranza a danni e ammaccature**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: Duoplant V.O.F.

Incrocio: CARA x AUSONIA

Diritti dei selezionatori: Scaduto

Plantula: HB 81-0036

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: tardiva / 5

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso viola / RV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: molto alto / 4

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: medio / 6,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5

Apparato fogliare - Selezionabilità: molto facile / 7

Colore della buccia: giallo con gemme rosse / Y/R

Colore della polpa: giallo paglierino / 6

Finitura della buccia: media / 6

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6

Tuberizzazione: media / 6

Calibro del tubero: grosso / 8

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: lunga / 8

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6,5

Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7

Crepe di crescita: abbastanza sensibile / 6

Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6,5

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Metribuzin: abbastanza sensibile / 6

Bentazone: - / -

Etilene: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5

Peso in acqua: 381

Contenuto in sostanza secca: 20,8%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: - / -

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: non adatta / 5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 1,9

Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Dormienza: lunga / 8



Consigli di coltivazione

Fertilizzazione ¹

Azoto: raccomandazione standard + 5%.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 4



Say potato,
say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: suscettibile / 5

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibile / 5

Necrosi anulare del tubero: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5

Peronospora tardiva-tubero: poco suscettibile / 7

Fusarium: poco suscettibile / 7

Scabbia comune: poco suscettibile / 7

Scabbia polverulenta: suscettibile / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: suscettibilità scarsa o assente / 9

Antracnosi: - / -

Erwinia: suscettibile / 5

Rogna nera F1: resistente / 10

Rogna nera F6: abbastanza suscettibile / 5

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: resistente / 9

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -