

# Spunta.



Tradizionale

Varietà di patata da consumo precoce, con buona tolleranza al calore e resa elevata.

- » **Tuberi di grandi dimensioni**
- » **Buona tolleranza alla siccità**
- » **Elevato contenuto di sostanza secca**



## Caratteristiche

### Caratteristiche generali

Selezionatore: J. Oldenburger  
 Incrocio: BEA x USDA 96-56  
 Diritti dei selezionatori: Scaduto  
 Plantula: Oldenburger 57-88

### Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6  
 Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV  
 Colore dei fiori: bianco / W  
 Numero di bacche: sotto la media / 6,5  
 Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: rapido / 8  
 Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8  
 Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5  
 Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5  
 Colore della buccia: giallo / Y  
 Colore della polpa: giallo paglierino / 6  
 Finitura della buccia: media / 6  
 Forma del tubero: lunga / L  
 Regolarità della forma del tubero: abbastanza regolare / 6  
 Tuberizzazione: media / 6  
 Calibro del tubero: grosso / 8  
 Regolarità del calibro: regolare / 7  
 Dormienza: media / 6

### Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: abbastanza sensibile / 6  
 Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7  
 Crepe di crescita: poco sensibile / 7  
 Danneggiamento da raccolta: molto sensibile / 4  
 Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8  
 Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8  
 Bentazone: - / -  
 Etilene: - / -  
 Peso in acqua: 387  
 Contenuto in sostanza secca: 21%  
 Consistenza in cottura: farinosa / BC  
 Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5  
 Scolorimento da cruda: - / -  
 Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: media / 6  
 Distribuzione della sostanza secca: - / -  
 Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: sotto la media / 5,5  
 Livello di GAT: -  
 Olio di cumino: da meno del 5% a più del 5% dei tuberi / 5  
 Dormienza: media / 6

# Consigli di coltivazione



## Fertilizzazione <sup>1</sup>

**Azoto:** raccomandazione standard - 10%.

**Fosfato:** raccomandazione standard.

**Potassio:** raccomandazione standard + 10%.

## Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

## Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 piante/ha)

## Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

## Fungicidi

È necessario adottare un programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora.

## Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

## Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Adatta alla conservazione a medio termine.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenze

**Virus - Accartocciamento fogliare:** poco suscettibile / 6

**Virus - Yn:** poco suscettibile / 6

**Virus - Yntn (tubero):** poco suscettibile / 6

**Necrosi anulare del tubero:** poco suscettibile / 6

**Peronospora tardiva-apparato fogliare:** suscettibile / 5,5

**Peronospora tardiva-tubero:** suscettibile / 5

**Fusarium:** suscettibile / 5,5

**Scabbia comune:** suscettibile / 5

**Scabbia polverulenta:** suscettibile / 5

**Virus - A:** suscettibilità scarsa o assente / 9

**Virus - X:** poco suscettibile / 6,5

**Antracnosi:** - / -

**Erwinia:** suscettibile / 5

**Rogna nera F1:** resistente / 10

**Rogna nera F6:** - / -

**Rogna nera F18:** - / -

**Nematode dorato Ro 1/4:** - / -

**Nematode dorato Ro 2/3:** - / -

**Nematode bianco Pa 2:** suscettibile / 2

**Nematode bianco Pa 3:** suscettibile / 2