

Agata.

Labai ankstyvos maistinės bulvės. Labai derlingos. Gumbai ovalūs, vienodo dydžio ir formos, patrauklia lygia odele.



**Mažmeninė
prekyba**
Sviežiam
vartojimui



**Tradicinis
segmentas**
Tradicinis

Image:

- ▶ **Vienoda gumbų forma ir dydis**
- ▶ **Geras atsparumas virusams**
- ▶ **Geras atsparumas sudaymams ir mechaniniams pažeidimams**

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Lantmännen Seed B.V.

Kryžminimas: BM 72-0052 x SIRCO

Veisėjo teisės: Galiojimas pasibaigęs

Daigas iš bulvių sėklos: GE 77-0134

Augalo ir gumbų savybės

Branda: labai ankstyva / 8

Šviesi daigelio spalva: raudonai violetinė / RV

Žiedo spalva: balta / W

Uogų skaičius: aukščiau vidurkio / 5

Lapų pradinis išsivystymas: greitas / 8

Lapų galutinis išsivystymas: geras / 8

Lapų tvirtumas: vidutinė / 6

Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6,5

Odelės spalva: geltona / Y

Minkštimo spalva: šviesiai geltona / 6

Bulvių odėlės kokybė: puiki / 8

Gumbų forma: ovali / O

Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7

Bulvių gumbų formavimasis: didelis / 8

Gumbų dydis: gana didelė / 7

Dydžio reguliavimas: gana taisyklinga / 6

Ramybės periodas: trumpas / 4

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6

Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6

Pažeidimai nuimant derlių: šiek tiek jautrus / 7

Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: gana jautrus / 6

Metribuzino naudojimas po sudygimo: gana jautrus / 6

Bentazonas: - / -

Augalų hormonas etilenas: 5 % mažiau arba 5 % daugiau gumbų / 5

Sausųjų medžiagų kiekis: 316

Sausųjų medžiagų kiekis: 17,6%

Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB

Spalvos pokytis po virimo: gana jautrus / 6

Spalvos pokytis po skutimo: gana jautrus / 6,5

Kepimo kokybė: netinkamas / 4

Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -

Traškumo kokybė: netinkamas / 4

Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 8

Karvono aliejus: 5 % mažiau arba 5 % daugiau gumbų / 5

S_Dormancy: trumpas / 4



How to grow

Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 20% trašų. Tręšti per du kartus: pagrindinį (prieš sodinimą) ir papildomą tręšimą (gumbų formavimos laikotarpiu).

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma.

Sėklos paruošimas sodinimui

Teisingai sudaiginti gumbai išaugina gausesnį derlių. Aplaužius daigus daugiau kaip vieną kartą sumažėja derlius ir gumbų dydis.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 augalai/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 augalai/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo gali sukelti tam tikrą lapijos reakciją ir šiek tiek sumažinti derlių.

Pasėlių priežiūra

Būtinai griežtas prevencinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienojų derlių imti po dviejų savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 4 °C. Veislė tinkama ilgai sandėliuoti.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: Šiek tiek jautrus / 6

Virusas - Yn: Šiek tiek jautrus / 7

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Purškimas: Šiek tiek jautrus / 6,5

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Jautrus / 5

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek jautrus / 6

Fuzariozė - sausasis puvinys: Jautrus / 5

Įprastoji rauplė: Jautrus / 5

Miltinė rauplė: Šiek tiek jautrus / 6

Virusas A: - / -

Virusas - X: Jautrus / 5

Juodoji dėmė: Šiek tiek jautrus / 6,5

Ervinija - minkštasis puvinys: Jautrus / 5

Rauplės F1: atspari / 10

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Auksinis nematodas Ro 5: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -