

Agria.

Pagrindinio derliaus perdirbimui skirta veislė. Geltonas minkštimas. Pasižyminti geru derliumi ir labai stabilia kokybe.



Ekologiniam auginimui
Ekologinis auginimas



Perdirbimui
Gruzdintoms bulvytėms
Traškučiams
Patogumas



Mažmeninė prekyba
Šviežiam vartojimui



Tradicinis segmentas
Tradicinis

- ▶ **Puiki kepimo kokybė**
- ▶ **Veislė atspari daugeliui virusų**
- ▶ **Gerai laikosi sandėlyje**

Image:

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Böhm
Kryžminimas: QUARTA x SEMLO
Veisėjo teisės: Galiojimas pasibaigęs
Daigas iš bulvių sėklos: BM 77-0945

Augalo ir gumbų savybės

Branda: pagrindinis derlius / 5
Šviesi daigelio spalva: mėlynai violetinė / BV
Žiedo spalva: balta / W
Uogų skaičius: nėra / 8
Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7
Lapų galutinis išsivystymas: geras / 8
Lapų tvirtumas: gana tvirta / 7
Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: gana lengvas / 7
Odelės spalva: geltona / Y
Minkštimo spalva: geltona / 7
Bulvių odelės kokybė: vidutinė / 6
Gumbų forma: ovaliai pailga / OL
Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7
Bulvių gumbų formavimasis: gana mažas / 5
Gumbų dydis: didelė / 8
Dydžio reguliavimas: taisiklinga / 7
Ramybės periodas: ilgas / 8

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6
Juoda dėmė (vidinė mėlynė): gana jautrus / 6
Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6,5
Pažeidimai nuimant derlių: jautrus / 5
Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: šiek tiek jautrus / 7,5
Metribuzino naudojimas po sudygimo: šiek tiek jautrus / 7,5
Bentazonas: gana jautrus / 6,5
Augalų hormonas etilenas: 5 % - 15 % daugiau gumbų / 6
Sausųjų medžiagų kiekis: 402
Sausųjų medžiagų kiekis: 21,8%
Gaminimo būdas: miltingos / BC
Spalvos pokytis po virimo: šiek tiek jautrus / 7
Spalvos pokytis po skutimo: šiek tiek jautrus / 7
Kepimo kokybė: puiki / 8
Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: vidutinis / 6,5
Traškumo kokybė: geras / 7
Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 2,7
Karvono aliejus: 25 % daugiau gumbų / 8
S_Dormancy: ilgas / 8



How to grow

Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma - 10% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma + 10% trąšų.

Sėklos paruošimas sodinimui

Rekomenduotina sodinti daigintus gumbus. Teisingai sudaiginti gumbai išaugina gausesnį derlių.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 augalai/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 augalai/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 augalai/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo gali sukelti tam tikrą lapijos reakciją, tačiau derlius retai sumažėja.

Pasėlių priežiūra

Rekomenduotinas prevencinis purškimas nuo maro pagal grafiką.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienujų mechaniniams pažeidimams jautrių veislių bulves kasti ne anksčiau kaip po 3 savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 5 °C. Maistinei vertei išlaikyti rekomenduotina sandėliuoti ne žemesnėje kaip 7 °C temperatūroje. Veislė tinkama ilgai sandėliuoti.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: Šiek tiek jautrus / 6

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 7

Purškimas: Šiek tiek jautrus / 7

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Jautrus / 5,5

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek jautrus / 7

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 6,5

Įprastoji rauplė: Labai jautrus / 4,5

Miltinė rauplė: Labai jautrus / 3

Virusas A: Šiek tiek arba visai nejautrus / 9

Virusas - X: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Juodoji dėmė: - / -

Ervinija - minkštasis puvinys: - / -

Rauplės F1: šiek tiek jautri / 9

Rauplės F6: gana jautri / 6

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: jautrus / 2

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: jautrus / 2