

Alouette.

Labai ankstyvos maistinės bulvės. Universalus panaudojimas. Atspari lapų ir gumbų marui, tinkama auginti ekologiškai.



Ekologiniam auginimui
Ekologinis auginimas



Perdirbimui
Patogumas



Mažmeninė prekyba
Šviežiam vartojimui



Tradicinis segmentas
Tradicinis

Image:

- ▶ **Vienoda gumbų forma ir dydis**
- ▶ **Tinka virimui ir kepimui**
- ▶ **Gera tolerancija sausrai**

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Agrico Research B.V.
Kryžminimas: AR 02-139-1 x LAURA
Veisėjo teisės: 31-12-2044
Daigas iš bulvių sėklos: AR 04-3153

Augalo ir gumbų savybės

Branda: ankstyvas pagrindinis derlius / 6
Šviesi daigelio spalva: raudonai violetinė / RV
Žiedo spalva: šviesiai violetinė / LP
Uogų skaičius: labai aukštas / 4
Lapų pradinis išsivystymas: greitas / 8
Lapų galutinis išsivystymas: geras / 8
Lapų tvirtumas: gana tvirta / 7,5
Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6
Odelės spalva: raudona / R
Minkštimo spalva: geltona / 7,5
Bulvių odelės kokybė: gera / 7
Gumbų forma: ovaliai pailga / OL
Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7
Bulvių gumbų formavimasis: vidutinis / 6
Gumbų dydis: gana didelė / 7
Dydžio reguliavimas: gana taisyklinga / 6,5
Ramybės periodas: vidutinis / 6

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6,5
Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6,5
Pažeidimai nuimant derlių: gana jautrus / 6
Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: šiek tiek jautrus / 7,5
Metribuzino naudojimas po sudygimo: šiek tiek jautrus / 7
Bentazonas: šiek tiek jautrus / 7
Augalų hormonas etilenas: 5 % mažiau gumbų / 4
Sausųjų medžiagų kiekis: 389
Sausųjų medžiagų kiekis: 21,1%
Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB
Spalvos pokytis po virimo: šiek tiek jautrus / 7
Spalvos pokytis po skutimo: šiek tiek jautrus / 7
Kepimo kokybė: aukščiau vidutinės / 6,5
Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -
Traškumo kokybė: - / -
Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 3,6
Karvono aliejus: 5 % - 15 % daugiau gumbų / 6
S_Dormancy: vidutinis / 6
Mutacijų dažnis: Ši veislė gali pasižymėti dažnomis mutacijomis. Todėl nerekomenduojama naudoti karvono aliejaus. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow



Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 10% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma + 20% trąšų.

Sėklos paruošimas sodinimui

Patartina sodinti į išilusią žemę. Teisingai sudaiginti gumbai išaugina gausesnį derlių. Aplaužius daigus daugiau kaip vieną kartą sumažėja derlius ir gumbų dydis.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 augalai/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 augalai/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo neįtakoja lapijos ar derliaus sumažėjimo.

Pasėlių priežiūra

Rekomenduotinas profilaktinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienojų mechaniniams pažeidimams jautrių veislių bulves kasti ne anksčiau kaip po 3 savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 5 °C. Maistinei vertei išlaikyti rekomenduotina sandėliuoti ne žemesnėje kaip 7 °C temperatūroje. Veislė tinkama sandėliuoti iki kovo mėnesio ir ilgiau.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: - / -

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 7

Purškimas: Jautrus / 5,5

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Šiek tiek arba visai nejautrus / 9

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek arba visai nejautrus / 9

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 7,5

Įprastoji rauplė: Šiek tiek jautrus / 6

Miltinė rauplė: Šiek tiek jautrus / 6,5

Virusas A: - / -

Virusas - X: Šiek tiek jautrus / 7

Juodoji dėmė: - / -

Ervinija - minkštasis puvinys: - / -

Rauplės F1: atspari / 10

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9

Auksinis nematodas Ro 2/3: tikslinis atsparumas / 8

Auksinis nematodas Ro 5: jautrus / 4

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -